Załącznik nr 1 do SIWZ „ Szczegółowy opis zamówienia ”

DTZ.261.16 ZP.2020

1. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia :
   Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych środków do mycia i dezynfekcji oraz higieny rąk wg poniższego asortymentu:

Lp.	Charakterystyka preparatu	Zakres działania	Opakowanie	Ilość
	PAKIET I- ŚRODKI DO MYCIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI DUŻYCH			
1.	Preparat na bazie nadwęglanu sodu i TAED - do mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi. Bez konieczności stosowania aktywatora. Przebadany w warunkach brudnych. Roztwór roboczy zachowujący aktywność przez 24 godz. Preparat nie może być klasyfikowany jako zagrożenie dla zdrowia	B, F, Tbc, V, S w czasie max 90 min. Możliwość skrócenia czasu do 15 min w stężeniu max 2%.	1 - 1,5 kg	130 kg
2.	**Preparat do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia pomieszczeń (nie zanieczyszczonych organicznie)** - przebadany również w warunkach brudnych - preparat na bazie alifatycznych czwartorzędowych związków amonowych - może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością, nie wymagajacy spłukiwania, nie posiadajacy efektu klejenia powierzchni; dobre właściwości myjące, nie uwalniający aktywnego chloru, tlenu, fenolu, aldehydu i biguanidów i amin; możliwość stosowania w obecności dawców/ personelu. Koncentrat nie może być klasyfikowany jako żrący dla skóry. Nie może zawierać zwrotów: H314, H317, H351.	niskie stężenie roztworu roboczego 0,25%; czas działania – 15 minut spektrum działania: B, Tbc (M. tuberculosis), F, HIV, HCV,HBV;	Butelka 1 l z wmontowanym dozownikiem przelewowym	500 op.
3.	Preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych. Gotowy do użycia, na bazie etanolu i alifatycznych IV rzędowych związków amonowych. Możliwość użycia przez przetarcie oraz spryskanie powierzchni i wyposażenia	Pełne spektrum działania B, C.albicans, Tbc(M. Terre) ,V (HIV,HBV,HCV, Adenowirusy, Herpeswirus,	650 ml – 1 l z rozpylaczem	300 l

	medycznego, przyjemny, nie drażniący zapach po użyciu preparatu, szybkie wysychanie nie pozostawiające smug na dezynfekowanych powierzchniach. Preparat nie może być klasyfikowany zagrożenie dla zdrowia i zawierać zwrotów żrących i drażniących na skórę - H 314, H 317	Rota, Corona Vaccinia, SARS) do 30 sek. F, M.avium, Noro max do 5 min;		
4.	Preparat chlorowy w postaci tabletek o działaniu sporobójczym do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni, Możliwość zastosowania do unieszkodliwiania zanieczyszczeń organicznych, nadający się do neutralizacji popłuczyn zanieczyszczonych substancjami organicznymi oraz plam rozlanej krwi – nietoksyczny roztwór użytkowy spełniający wysokie wymagania w zakresie ochrony środowiska, szybkie i całkowite rozpuszczanie tabletek, łatwe odmierzanie środka do przygotowywania roztworów,	Działanie w stężeniu podstawowym B,Tbc,F,V,S (Clostridium Difficile) w 15 min. w stężeniu 1000 ppm. Mozliwość zastosowania do powierzchni zanieczyszczonych C.difficile w stężeniu max 2000 ppm w czasie 15 min.	a 200 tabletek	100 op.
	PAKIET II- ŚRODKI DO MYCIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI MAŁYCH			
1.	Suche chusteczki z chlorem do zalewania wodą przeznaczone do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, wyposażenia, miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz usuwania plam krwi. włóknina o wysokiej gramaturze i chusteczki w dużym rozmiarze min. 20 cm (tolerancja ± 10%)	Szerokie spektrum biobójcze obejmujące: bakterie, prątki, grzyby, wirusy (w tym: HIV, HBV, HCV, Polio, Adeno), spory (C. difficile, C,.difficile 027, C.perfringens, B.subtilis). - 15 min,	dostarczane w opakowaniu typu flow-pack z klipsem zabezpieczajacych chusteczki przed wysychaniem. Wielkość opakowania 25szt. ± 10 %	150 op.

2.	Gotowe do użycia alkoholowe chusteczki dezynfekcyjne do przecierania małych powierzchni i sprzętu medycznego. Przebadane również w warunkach brudnych. włóknina o wysokiej gramaturze (45-50g/m$^{2)}$ i chusteczki w dużym rozmiarze min. 20 cm (tolerancja ± 10%)	B, Tbc, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 1 min.	dostarczane w opakowaniu typu flow-pack z klipsem zabezpieczajacych chusteczki przed wysychaniem. Wielkość opakowania 50 szt. ± 10 %	3400 op
3.	Gotowe chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni i wyrobów medycznych, wrażliwych na działanie alkoholi, przebadane dermatologicznie, włóknina o wysokiej gramaturze (45 – 50g/m$^{2)}$ i dużym rozmiarze min. 20 cm (tolerancja ± 10%)	działanie B, F, V (HBV, HCV, Adeno, Noro, Polioma, RSV, HSV)	dostarczane w opakowaniu typu flow-pack z klipsem zabezpieczajacych chusteczki przed wysychaniem. Wielkość opakowania 50 szt. ± 10%	700 szt.
PAKIET III – SYSTEM ZAMKNIĘTY DO HIGIENY I DEZYNFEKCJI RĄK				
1.	Preparat do mycia rąk - czyste mikrobiologicznie mydło w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i skóry na bazie naturalnych surowców, zawierający substancje pielęgnujące, bez konserwantów, czyste mikrobiologicznie, hypoalergiczne. Ph 5.5 Konfekcjonowany w jednorazowych pojemnikach, biodegradowalnych, zabezpieczonych podwójną zastawką mikrobiologiczną zabezpieczającą przed infekowaniem w trakcie stosowania. Kompatybilny z posiadanym w RCKiK systemem dozującym Sterisol (kompatybilność potwierdzona przez producenta/producentów). Konsystencja żelowa.		Worki/butelki o poj. 700 ml – 1000 ml	350 L
2.	Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz skóry przed injekcjami, na bazie etanolu, nie może zawierać barwników i innych substancji aktywnych biobójczych i bakteriostatycznych, przeznaczony do częstego stosowania, delikatny dla skóry, nie wysuszający skóry. Wymagany status wyrobu medycznego. Konfekcjonowany w jednorazowych pojemnikach, biodegradowalnych, zabezpieczonych podwójną zastawką mikrobiologiczną zabezpieczającą przed infekowaniem w trakcie stosowania. Opakowania kompatybilne z posiadanym w RCKiK systemem dozującym Sterisol (kompatybilność potwierdzona przez producenta/producentów).	Spektrum B, Tbc, F,V (HIV, HBV, HCV, Polio, Rota, Adeno)	Worki/ butelki o poj. 700 ml	450 szt.

3.	Dozowniki łokciowe, z trwałego tworzywa bez elementów metalowych i transparentnych, maksymalnie 3 części składowe w tym dodatkowe zabezpieczenie zaworu dozującego przed bezpośrednim kontaktem z dłonią, ściana obudowy przejrzysta, pozwalająca na łatwą identyfikację produktu, bez konieczności opisywania. Wskazana płytka montażowa wykluczająca wiercenie dodatkowych otworów w ścianie przy wymianie dozowników. Kompatybilne z oferowanymi preparatami.			40 szt.
4.	Alkoholowy preparat (hydrożel) o właściwościach tiksotropowych do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk Na bazie etanolu, zawierajacy bisabolol i glicerynę. Nie może zawierać pochodnych fenolu, barwników i substancji zapachowych. Przebadany dermatologicznie.	Spektrum działania: B (MRSA), Tbc, F,V (HIV, HBV, HCV) w 30 sekund, Polio, adeno- 1 minuta	Butelka stojąca plastikowa z pompką dozującą fabrycznie zamontowaną - 0,5l	720 szt.
5.	Wieszak/uchwyt na preparat wyszczególniony w 4. Nie wymagający montażu na stałe z możliwością powieszenia preparatu na stanowisku pracy. Wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne			44 szt.
PAKIET NR IV- ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI SKÓRY PRZED INIEKCJAMI				
1.	Niebarwiący skóry, preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, preparat alkoholowy zawierający dodatkowo dwie substancje czynne różnych grup chemicznych, przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk i skóry, zawierający chlorheksydynę. Wyrób medyczny.	Działający w czasie 15 sek. na mikroorganizmy występujące na Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s.	Butelka 0,5 l – 1 l	700 l

2.	Niebarwiący skóry, preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, zabiegami, punkcjami i pobieraniem krwi, oparty o mieszankę co najmniej dwóch alkoholi (substancji aktywnych). Niezawierający jodu i jego związków. Przebadany klinicznie i dermatologicznie. Wyrób medyczny	Działający w czasie 15 sek. na mikroorganizmy występujące na skórze, na bakterie (wyłącznie z MRSA i Tbc), grzyby, wirusy (HBV- 2 min., HIV, Herpes, Rota, Adeno) Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s.	Butelka 0,5 l – 1 l	200 l
3.	Niebarwiący skóry, preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, oparty o mieszankę trzech alkoholi i nadtlenku wodoru. Niezawierający jodu i jego związków. Przebadany klinicznie i dermatologicznie. Wyrób medyczny.	Działający w czasie 15 sek. na mikroorganizmy występujące na skórze, na bakterie (wyłącznie z MRSA i Tbc), grzyby, wirusy (HBV- 2 min., HIV, Herpes, Rota, Adeno) Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s.	Butelka 250- 350 ml z atomizerem	192 l
PAKIET V- CHUSTECZKI DO NASĄCZANIA DO MYCIA I DEZYNFEKCJI				
1.	Jednorazowe ściereczki szerokiego zastosowania (mycie, dezynfekcja, konserwacja) do nasączania środkiem dezynfekującym do powierzchni, wykonane z włókniny niskopyłowej, wytrzymałe na rozdarcie o gramaturze min 50 g/m2 (tolerancja ± 5%) w dużym rozmiarze i kolorze uniemożliwiającym powstawanie przebarwień po zalaniu środkiem dezynfekcyjnym		1 op. = zwój 250 szt. ± 10%	650 op.
2	Pojemniki z systemem dozującym do ściereczek włókninowych z poz. 1, wielokrotnego użytku z możliwością mycia maszynowego. Zabezpieczenie chroniące nasączone ściereczki przed wysychaniem. Zaopatrzone etykietą bezpieczeństwa zawierającą podstawowe informacje dotyczące preparatu którym będą nasączane chusteczki.		Pojemniki pasujące do ściereczek z pozycji 1	20 szt.